

RESSONÂNCIA CARDÍACA E ANGIO-TC CORONARIANA

Orientações de preparo

Nas 48 horas que antecedem o exame:

- O cliente deve suspender o uso dos medicamentos sildenafil (Revatio® e Viagra®), tadalafila (Cialis®) ou vardenafila (Levitra® e Vivanza®).

*** OBS.: SÓ SUSPENDER AS MEDICAÇÕES DE USO CONTÍNUO, SE O MÉDICO QUE SOLICITOU O EXAME AUTORIZAR.**

Nas 24 horas que antecedem o exame:

- O cliente não deve ingerir produtos que apresentem cafeína e outras xantinas em sua composição, como café (mesmo o descafeinado), chás, chocolate (inclusive como ingredientes de bolos, sorvetes ou caldas), refrigerantes (mesmo bebidas levemente gaseificadas e água tônica), bebidas energéticas, banana (inclusive banana da terra) e alguns medicamentos. O consumo dessas substâncias inviabiliza a realização do exame.

- Não usar medicamentos que contenham **Cafeína**, como Neosaldina, Cibalena, Dorflex e alguns antigripais. Se necessário leia a composição do remédio na bula. Na dúvida não use.

- Não usar (**aminofilina, berotec, atrovent**) 36 horas antes do exame. Esses medicamentos estão presentes em alguns medicamentos para ASMA e BRONQUITE, aerossóis e xaropes.

- Não ingerir bebidas alcoólicas.

- Não utilizar cremes, pomadas, loções ou óleos sobre a pele do tórax.

No dia do exame:

- Fumantes precisam ficar sem fumar pelo menos três horas antes do exame e uma hora após seu término.

- Não fazer exercícios físicos.

- Jejum de quatro horas antes da realização do exame.

- Realizar depilação do tórax (peito) para colocação dos eletrodos.

* Trazer exames anteriores (Teste Ergométrico, Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Cateterismo, Cintilografias anteriores.)

EXCLUSIVO PARA PACIENTES QUE FARÃO RM DO CORAÇÃO COM ESTRESSE:

Contra-indicações

- O estresse com Dipiridamol é contra-indicado para portadores de asma ativa, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), angina instável, enxaqueca importante, quadro febril e processos infecciosos agudos.

ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CORONÁRIAS

DESCRIÇÃO DO EXAME:

O exame de angiotomografia das artérias coronárias é exame novo, que vem ganhando cada vez mais espaço dentro da cardiologia. As imagens geradas pelo tomógrafo de 128 detectores nos permite a visibilidade dos vasos que levam o sangue ao coração (artérias coronárias).

CONTROLE DE FREQUÊNCIA CARDÍACA:

Para a realização do exame, é necessário o controle e estabilização da frequência cardíaca. O número de frequência cardíaca por minuto deverá ser o mais próximo de 65 ou abaixo. Para isso, são utilizados medicamentos betabloqueadores, que são ivabradina, propranolol, metropolol comprimidos e o esmolol ampolas para o uso endovenoso. Esses medicamentos são seguros, porém não podem ser usados por pessoas portadoras de asma grave. Após o exame, esses medicamentos não terão efeitos significativos e o paciente poderá voltar à sua rotina normalmente.

DILATAÇÃO DA CORONÁRIA:

Como a finalidade de causar uma pequena dilatação das coronárias, utilizamos uma dose baixa de medicamento isordil. Após o exame, esse medicamento não terá efeito significativo e o paciente poderá voltar à sua rotina normalmente.

CONTRASTE IODADO:

Para a visualização dos vasos, é necessária a injeção de contraste iodado. Esse procedimento é bastante seguro, sendo evitado apenas em pessoas que tiveram comprovadamente reação alérgica grave ao contraste iodado ou tenha insuficiência renal. Na clínica BDI utiliza-se apenas o tipo não ionico, que é hipoalergênico. É importante ter em mente que durante a injeção de contraste poderá haver uma discreta sensação de calor no corpo, que passa rapidamente.

PAUSA RESPIRATÓRIA:

Algumas vezes durante o exame, será solicitado que se encha o peito de ar e segure. Nesse momento é muito importante que o paciente segure os pulmões cheio de ar e fique completamente imóvel até que seja dito para respirar novamente. É importante que se encha sempre a mesma quantidade de ar.

RISCOS DO EXAME:

A angiotomografia é um exame bastante seguro. Nossos procedimentos e precauções são os mesmos dos maiores centros que realizam o exame. Como toda medicação, o contraste pode causar reações em algumas pessoas. Os tipos de reação são alergia de pele, náuseas e vômitos. Outras reações mais graves podem ocorrer e a clínica BDI está equipada para o atendimento necessário.

Todos os procedimentos relativos ao exame são acompanhados por um médico cardiologista especializado na sua realização.

DURANTE O EXAME: Após conseguirmos chegar na frequência cardíaca, o paciente estará liberado para o exame, ao chegar a sala de tomografia, a duração é em média de 15 minutos.