

Cintilografia para detecção de hemorragia digestiva ativa Preparo e orientações

OBS : Mulheres grávidas, com suspeita de gravidez ou amamentando não poderão realizar o exame. Caso haja urgência da realização do exame em mulheres que estejam amamentando, suspender o contato íntimo com a criança por no mínimo 24 horas e o aleitamento deverá ser interrompido nas próximas 72 horas após administração do material radioativo.

Orientações gerais:

- Pacientes menores de 18 anos ou incapazes devem permanecer acompanhados por responsável que deverá permanecer no local até o final do exame. Por medidas de proteção radiológica, não venha acompanhado por mulheres grávidas ou crianças.
- Chegar com 30 minutos antes do horário agendado;
- Trazer documento com foto, cartão do convênio, pedido médico e guia autorizada pelo convênio;
- Se possuir, traga exames recentes relacionados ao seu caso;
- Trazer receituário ou nome dos medicamentos em uso;
- No dia do exame, usar roupas que não contenham metais;
- Suspensão de medicamentos que possam alterar a eficiência de marcação de hemácias, para a pesquisa de sangramento intermitente, como hidralazina, prazosin, propranolol, digoxina, metildopa, penicilina, quinidina, heparina e contrastes iodados;
- Níveis baixos de hematócrito e hemoglobina também podem alterar a eficiência de marcação das hemácias;
- Informar o atendente sobre marcapassos, piercings e próteses metálicas;
- Reservar um período todo do dia, a contar do horário agendado, para realização do exame;
- O limite de peso para a execução do exame é de 130 kg.
- Trazer dados: peso e altura.

Para estudo de sangramento ativo:

O paciente será encaminhado à sala de exame, será posicionado na maca do aparelho e deverá permanecer deitado por aproximadamente 30 a 45 minutos.

Uma veia periférica será puncionada e o radiofármaco administrado.

A aquisição das imagens será realizada imediatamente após a injeção venosa do radiotraçador.

Para estudo de sangramento intermitente:

O paciente será encaminhado à sala de injeção e será aplicado por via venosa o medicamento para reduzir as hemácias.

Após 20 minutos, o paciente será encaminhado à sala de exames, será posicionado na maca do aparelho e deverá permanecer deitado por 60 minutos.

Uma veia periférica será novamente puncionada e o radiofármaco será administrado.

As imagens dinâmicas serão adquiridas imediatamente após a administração do radiofármaco. Após 60 minutos de aquisição, o paciente será liberado e orientado a retornar a clínica em intervalos consecutivos até 24 horas após a injeção.

RECOMENDAÇÕES:

Após a realização da cintilografia, procure evitar o contato prolongado com outras pessoas por um período de 24 horas, pois elas estariam sendo expostas de maneira desnecessária à radiação; Caso você trabalhe diretamente com crianças de colo, deverá se ausentar do trabalho, através de atestado médico, por 1 dia, a contar do dia do exame.